

1. *A Catalogue of the FIFTY PLANTS from Chelsea Garden, presented to the ROYAL SOCIETY by the Company of Apothecaries, for the Year 1737. pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane, Bart. Med. Reg. & Soc. Reg. Præf. by Isaac Rand, Apothecary, F. R. S. Hort. Chel. Præf. ac Prælec. Botan.*

751. **A** CETOSA Ægyptia; roseo feminis involucro; folio lacero; *Lippi. D. Shaw Phyt. Afr. Spec. N<sup>o</sup>. 5.*

752. *Adiantum nigrum; radice prælonga, arbores annosas perreptante. Gris. Virid. Lusitan.*

*Filicula Lusitanica; Polypodii radice. T. Inst. 541.*

753. *Admirabilis Peruviana; flore rubro. Clus. rar. Plant. Hist. Lib. V. p. 89. Sloan. Cat. Jam. 91.*

754. *Androsæmum maximum frutescens. C. B. 280.*

755. *Aralia Canadensis. T. Inst. 300.*  
*Panaces καρπικον sive racemosa, Canadensis. Cornut. 74.*

756. *Astrantia major; corona floris candida. T. Inst. 314.*

757. *Astrantia major; corona floris purpurascens. T. Inst. 314.*

758. *Betonica Orientalis; folio angustissimo, & longissimo; spica florum crassiori. T. Cor. 13.*

A

759. Bi-

759. *Bidens Americana triphylla*; foliis angustis, acutis.

*Chrysanthemum Virginianum*, folio acutiore lævi trifoliato; seu *Anagyridis* folio. H. Ox. III. p. 21.

760. *Campanula pentagonia*, perfoliata. *Morif.* H. Ox. II. 457.

761. *Cassine vera* perquam similis, *Arbuscula Phillyreæ* foliis antagonistis. Ex Provincia Caroliniensi. *Pluk. Mantiss.* p. 40. *Phytogr. Tab.* 381. *Fig.* 3.

762. *Cepa fissilis*. *Matthiol.* 555.

763. *Cepa Aiscalonia*. *Matthiol.* 556.

764. *Chenopodium Ambrosioides Mexicanum fruticosum*.

765. *Christophoriana Americana* procerior & longius spicata. *Dillen. H. Elt. Tab.* 67.

766. *Commelina angustifolia procumbens*.

767. *Dalea*. *Dni. Millar inventoris*.

768. *Dentaria bulbifera*. *Lob. Icon.* 687.

769. *Digitalis minima*, *Gratiola dicta*. H. Ox. Part. II. 479.

*Gratiola Centauroides*. C. B. 279.

770. *Elichrysum*; angustissimo folio. *T. Inst.* 452.

*Stæchas citrina tenuifolia altera, sive Italica*. J. B. III. 155.

771. *Epimedium*. C. B. 323. *Dod.* 599.

772. *Eruca sylvestris*. *Ger.*

*Eruca sylvestris tenuifolia perennis; flore luteo*. J. B. II. 861.

773. *Eruca; Bellidis folio*. *Mor. H. Ox. P. II.* 231.

774. *Eupatorium cannabinum*. C. B. 320.

*Eupatorium Avicennæ* Officin.

775. Eu-

775. Eupatorium; folio oblongo rugoso; caule purpurascente. *T. Inst.* 456.

776. Fagopyrum erectum; seminibus ad angulos dentatis, spicatum nascentibus. *Ex Russia.*

777. Ficus Orientalis; foliis in lacinias angustas profunde incis. *s.*

*The large white Turkey Fig.*

778. Fumaria officinarum & Dioscoridis. *C. B.* 143.

779. Fumaria bulbosa; radice cava, major. *C. B.*

143.

780. Fumaria lutea. *C. B.* 143.

781. Fumaria semper virens & florens; flore albo. *Boerh. Ind. I.* 130.

782. Galeopsis patula segetum; flore purpurascente. *T. Inst.* 185.

*Sideritis arvensis rubra.* Park.

783. Hernandia; amplo Hederæ folio, umbilicato. *Plum. Nov. Gen.* 6.

*Nux vesicaria oleosa, foliis umbilicatis, ex Insula Barbadosi.* Pluk. Phyt. 208. Fig. 1.

784. Hypericum Androsæmum dictum. *J. B. III.* 382.

*Androsæmum alterum hirsutum.* Colum. Ec.

75.

785. Lycopersicon Galeni. *Ang.* 217.

786. Petiveria, Solani foliis; loculis spinosis. *Plum. Nov. Gen.* 50.

*Verbenæ aut Scorodonie affinis anomala, flore albedo; calyce aspero; Allii odore.* Sloan. Cat. Jam.

64. Guinea Hen weed. Hist. I. 172.

787. Pyrethrum Officinarum.

*Pyrethrum flore Bellidis.* *C. B.* 148.

*Chamæmelum specioso flore; radice longa ser-  
vida.* D. Shaw. Phyt. Afric. Spec. No. 138.

788. *Pyrethrum frutescens Canariense.*

*Leucanthemum Canariense; foliis Chrysan-  
themæ; Pyrethri sapore.* T. Inst. 666.

789. *Rapuntium Americanum, flore dilute cœ-  
ruleo.* Ac. Reg. Par.

790. *Rapuntium Virginianum; foliis oblongis;  
floribus parvis cœruleis, spica longissima laxa.*

191. *Reseda alba.* J. B. III. 467.

792. *Reseda crispa Gallica.* Bocc. Rar. 76.

793. *Solanum fruticosum bacciferum.* C. B. 166.

794. *Thlaspidium fruticosum; Leucoii folio, sem-  
per florens.* T. Inst. 214.

*Thlaspi fruticosum Persicum; foliis Keiri, flore  
odorato.* Zanon. 196.

795. *Trichomanes sive Polytrichum Officinarum.*  
C. B. 356.

796. *Turritis vulgaris ramosa.* T. Inst. 224.

*Pilosella filiquata Thalii.* Tab. vii.

797. *Turritis Leucoii folio.* T. Inst. 224.

798. *Turritis Leucoii folio; floribus amplioribus.*

799. *Ulmaria.* Clus. Hist. CXCVIII.

*Barba Capræ floribus compactis.* C. B. 164.

800. *Ulmaria; floribus in longas spicas congestis.*  
*Boerb. Ind. Alt. 295.*

*Barba Capræ floribus oblongis.* C. B. 163.